vol.7

### 臨床検査科



検査科は、臨床検査技師3名にて構成されている。業務のメインは、医師の指示の下で血液検査や生理検査から得られた情報を迅速に医師へ報告する臨床検査であるが、それ以外に輸血業務や院内感染対策や職員の健康診断を介しての健康管理、他部署との業務連携等求められる業務は、多岐に渡っている。特に院内感染対策については、多大な成果を残していると自負している。今後も院内外における情報の収集を行い、最適かつ的確な検査のシステムを提供できる体制を構築して行きたいと考えている。

主任 土屋 孝三

# \*

### 准看護学生、もうすぐ2年生です。 現在仲間を募集中です。

准看護学生は、もうすぐ2年生になります。2年生は長期間の病院実習が始まります。楽しみでありますが、ちょっぴり不安です。がんばります。 病院では、准看護学生を募集中です。私たちの後輩となります。ご応募お待ちしております。



院内での講習風景(感染対策):真剣な顔をしています。

# 専門外来案内

※1 脊椎外
※2 2回/月

		月	火	水	木	金	±
整形専門 外来	午前	0	0	i	0		
	午後	0	 	*1O	0		/
脳神経 外科	午前		0	1		l I	
	午後			 		0	/
循環器科	午前	0	 				
	午後	0	0			0	/
内分泌 内科	午前		0	 			<sup>*2</sup> O
	午後						/
皮膚科	午前		 	 			
	午後		0	!		0	/
神経内科	午前		0			0	<sup>*2</sup> O
	午後		 	 			/

## 編集後記

あけましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。毎年同じ言葉を使っているが、いつも新鮮に感じる言葉である。

社会人になってもう30年以上過ぎてしまったが、「年々1年が短く感じるようになってきた」と言ったら、「毎年同じことを言っている」と「年をとった証拠」と言われた「そうなんだ」と思う今日この頃である。(笑) (M・I)

# 医療法人 明和会 辻村外科病院

〒448-0001 愛知県刈谷市井ヶ谷町桜島20-1 Tel(0566)36-5200 Fax(0566)36-5561 http://tsujimurageka-hp.com/

発行日:2015年1月1日 発行者:辻村外科病院広報委員会



#### 【基本理念

# Smile&Harmony

~明るい笑顔と調和~

#### (基本方針)

- いつも明るく患者様の満足を常に考え、 医業に専念します。
- ・地域に働く人々及びその御家族の幸せを 第一に考え、信頼される調和のとれた病 院を目指します。
- ・同じロマンを持つスタッフが一丸となり 得られた成果を社会に還元し、医療の質 向上に努めます。

#### 患者様には以下の権利と責任があります。

- ・個人としてその人格を尊重され、適切な医療 を平等に受ける権利があります。
- ・病名、病状、予後、検査と治療の内容と危険性、薬の効果と副作用などについて十分に理解できるまで説明を受ける権利があります。
- ・治療法など自らの意思で選択する権利があり ます。
- ・個人の情報やプライバシーが守られる権利が あります。
- ・これらの権利を守るため、患者様は医療従事者と力を合わせて医療に参加、協力する責任があります。





新年あけましておめでとうございます。

日頃は病院運営にあたり格別なるご高配を賜り厚くお礼申し上げます。

さて、今年は、病院運営に多大な影響をあた える診療報酬改定のはざまの年になります。

昨年度の診療報酬改定も大変厳しい改定となりましたが、次回の改定(平成28年度)においても経済状況を考えると大変厳しい改定になることが予想されます。

しかしながら取り巻く環境が厳しい中において も、医療の質を向上させることが当院に課せられ た使命でもあることから、病棟の療養環境の整 備を中心に進めてまいりたいと考えております。

大きな改修等は予定しておりませんが、療養環境の整備を行うにあたり、皆様にはご迷惑とご協力をお願いすることになると思いますが、今後ともご指導・ご鞭撻を賜ります様お願い致します。

平成27年1月 医療法人 明和会 辻村外科病院

病院長 辻村 秀

### 病気の説明シリーズ Vol.18

今回はノロウイルス、ロタウイルスを原因とした 感染性胃腸炎について、感染、発症してしまった 場合の対処、予防方法についてご紹介します。

(監修:病院長 辻村 享)

#### 症状

#### ●ノロウイルス

吐き気、嘔吐、下痢、腹痛、これらの症状が1~ 2日続きます。

脱水症状に十分注意しましょう。

#### ●ロタウイルス

乳幼児の急性重症胃腸炎の主な原因ウイルスとして知られています。

水のような下痢や嘔吐、重い脱水症状が数日間続くことがあります。

※合併症が起こることがあり、意識の低下やけいれん等の症状みられたら速やかに、近くの医療機関を受診しましょう。





### 感染経路

#### ●ノロウイルス

- ・感染者の糞便や嘔吐物
- ・人から人への飛沫
- ・汚染された二枚貝を生あるいは十分に加熱調理 しないで食べた場合等

#### ●ロタウイルス

患者の便を処理した後、十分に手洗いをしても、 手や爪に数億個ものウイルスが残っていることが あり、ロタウイルスが付いた手などから感染が広が ります。





#### 処 理 方 法

#### ●ノロウイルス

感染者の糞便や嘔吐物を処理する場合は、部屋を十分に換気し、使い捨ての手袋やマスクをつけ、タオルやペーパータオルなどで嘔吐物を除去します。その後、家庭用塩素系漂白剤やアルコールで消毒します。おむつや拭き取りに使用したタオルやペーパータオルは、ビニール袋に密閉し、漏れないようにして廃棄しましょう。

#### ●ロタウイルス

オムツを交換するときには使い捨てのゴム手袋などを使い、捨てる場合はポリ袋などに入れます。

手洗いは指輪や時計をはずし、せっけんで30秒以上 もみ洗いします。衣類が便や吐物で汚れたときは、家 庭用塩素系漂白剤でつけおき消毒した後、他の衣類と 分けて洗濯しましょう。

※ロタウイルスはアルコールなどの 消毒薬ではあまり効き目がありません。



## 予 防 方 法

#### ●ノロウイルス

- ・汚染のおそれのある二枚貝などの食品の場合は、中 心部まで85℃~90℃で90秒以上の加熱する。
- ・調理器具等は洗剤などを使用し十分に洗浄した後、 家庭用塩素系漂白剤(塩素濃度200ppm)で浸 すように拭くことでウイルスを失活化できます。 また、まな板、包丁、へら、食器、ふきん、タオル等は 熱湯 (85℃以上)で1分以上の加熱が有効です。
- ・手洗いを徹底する。

帰宅時や、調理を行う前、食事前、トイレの後等、 手洗いを行いましょう。指輪等をはずし、石けんを十 分泡立て、ブラシなどを使用して手指を洗浄します。

#### ●ロタウイルス

手洗いや消毒を徹底するのはもちろんですが、それらの取組みを行ってもロタウイルスは感染力が非常に強いので、感染を完全に予防することは困難です。

日本では、2種類のロタウイルスのワクチンがあり、任意で接種を受けることができます。いずれのワクチンも乳児が対象。





# 栄養科よりく

